

As

Амінозол®

Органічні азотні добрива - Амінокислоти

9 % органічно зв'язаного азоту (111 г/л N)

- Компоненти: 9% органічно зв'язаного N (111 г/л)
- Густина: 1,23 кг/л
- Показник pH: 5 - 7

Температура зберігання: від -5 °C до +35°C

Об'єм тари: 5 л, 10 л, 200 л, 1000 л

Дія препарату:

Роль амінокислот: Амінокислоти - це структурні елементи для білків, вуглеводів, хлорофілу і т. д., які прекрасно засвоюються через листя та беруть участь у фотосинтезі. Таким чином, рослина отримує не лише необхідні поживні речовини окремими частинами, як зазвичай, (азот, вуглекислий газ, вода), але й цілі комплексні структурні елементи. Таке живлення стимулює процес росту рослини, особливо в стресових ситуаціях. Деякі амінокислоти являються складовими частинами ауксинів, які стимулюють поділ клітин і розвиток кореневої системи. Разом з тим амінокислоти сприяють додатковому зволоженню рослин, таким чином покращуючи ефективність дії добрив та полегшують їх засвоєння. Амінокислоти також мають специфічний запах, якого уникають дикі тварини.

Культура	Ціль	Рекомендації
Для всіх культур	Зменшення стресу	2 - 3 л/га при стресі багаторазове застосування з маленькими нормами внесення підвищує ефективність
	Покращення ефективності заходів по захисту рослин	150 - 300 мл на 100 л води до робочого розчину 33P
	Відлякуюча дія на тварин	2 л/га за 2 - 3 дні розмішати з 2 л води при потребі
Зернові	Урожайність, життєздатність	2 - 3 л/га до досягнення повноти насадження
Цукровий буряк, Ріпак, Кукурудза, Картопля, Плодоовочеві рослини, Капуста, листові та цибулеві овочі, Спаржа, коренеплодові та бульбові овочі	Підвищення ефективності та толерантності до обприскування, врожайність	1 - 2 л/га, обприскування з післясходовим гербіцидом, особливо при екстремальних погодніх умовах
Картопля	Більш швидке відростання бадилля у ранньої картоплі після зняття плівки	2 - 3 л/га 1-й обробіток
Полуниця, Плодоовочеві рослини, Капуста, листові та цибулеві овочі, Спаржа, коренеплодові та бульбові овочі	Формування кореневої системи, підсилення росту, початковий розвиток	Занурення рослин в 1%-й розчин або обприскування з нормою 5-10 л/га до пересадки, або 7-10 днів після посадки
Полуниця	Якість рослин при збільшеній густині висадки: сильні рослини, формування відгалужень	2 внесення по 2 - 3 л/га 14 і 7 днів перед збором урожаю
Зерняткові плодови	Зав'язь, розмір та колір плоду, зменшення ураження іржею	2 рази по 5 - 7,5 л/га для яблук: червоні бутони і стадія кульок; для груш: до та після цвітіння
	Покращення ефективності та переносимості обприскування хлористим кальцієм	1 - 2 л/га з обприскуванням кальцієм хлориду
Кісточкові плодови, Полуниця, Ягідники, Столовий виноград	Закладка резервних речовин, регенерація, зимостійкість, якість цвітіння	2 внесення по 2 - 3 л/га після збору врожаю
Кісточкові плодови	Зав'язь, ріст плоду, зменшення пошкоджень	3 внесення по 5 - 7,5 л/га з моменту цвітіння з інтервалом 8 днів
Виноград винних сортів	Рівномірний розвиток та дозрівання	4 внесення по 3 - 5 л/га після формування паростків, до моменту повного цвітіння, після закінчення цвітіння, під час змикання ягід
Декоративні рослини	Якість листків, ріст	декілька внесень 100 - 300 мл на 100 л води (2 - 3 л/га) протягом вегетаційного періоду

Офіційний дистрибутор в Україні:

ТОВ «Біоферт»
м.Тернопіль
Тел./Факс: +38 (0352) 22-55-12
office@biofert.com.ua
www.biofert.com.ua