

Mg

Лебозол®-Магnezіум⁵⁰⁰

Добрива, які відповідають стандартам ЄС

Суспензія гідроксиду магнею

34,7 % Оксиду магнею (500 г/л MgO)

- Компоненти: 34,7 % MgO (500 г/л)
- Густина: 1,44 кг/л
- Показник pH: 10

Температура зберігання: не нижче 0° C

Об'єм тари: 10 л

Дія препарату:

Магній є важкодоступним у піщаних, кислих ґрунтах, в ґрунтах з великим вмістом калію, при холоді та сирості. Нестача магнею проявляється у пожовтінні листя, в'яненні стебел, завчасному старінні культури, передчасному опаданні листків.

Культура	Ціль	Рекомендації
Для всіх культур	Забезпечення магнієм	2 - 4 л/га для позакореневого підживлення (вода: мін. 200 л/га) При використанні ранцевого обприскувача 0,75 %-ний розчин.
Зернові	Урожайність, стійкість, забезпечення магнієм	1 - 2 внесення по 2 - 4 л/га від початку кущення до фази виходу в трубку
Кукурудза	Урожайність, стійкість, забезпечення магнієм	1 - 2 внесення по 2 - 4 л/га від стадії 4-х листків
Ріпак	Урожайність, стійкість, забезпечення магнієм	1 - 2 внесення по 2 - 4 л/га між стадією 6-ти листків та початком росту пагонів
Цукровий буряк	Урожайність, стійкість, забезпечення магнієм	1 - 2 внесення по 2 - 4 л/га між стадією 6-ти листків та змиканням міжрядь
Картопля	Запобігання передчасному опаданні листя, урожайність та забезпечення магнієм	1 - 2 внесення по 2 - 4 л/га від початку змикання міжрядь
Плодоовочеві рослини, Капуста, листові та цибулеві овочі, Спаржа, коренеплодові та бульбові овочі	Якість листків, колір листків, фотосинтез, забезпечення магнієм	1 - 2 внесення по 3 - 4 л/га відразу після формування достатньої листової маси
Ягідники	Запобігання передчасному опаданні листків та забезпечення магнієм	2 - 3 внесення по 3 - 4 л/га від початку цвітіння до збору врожаю
Полуниця	Урожайність, стійкість, забезпечення магнієм	2 - 3 внесення по 4 л/га від початку цвітіння до збору врожаю
Зерняткові плодови	Запобігання передчасному опаданні листків та забезпечення магнієм	декілька внесень по 4 л/га починаючи з кінця періоду цвітіння (для сортів схильних до іржі з моменту досягнення плодами розміру грецького горіха)
Кісточкові плодови	Запобігання передчасному опаданні листків та забезпечення магнієм	2 - 3 внесення по 4 л/га з моменту формування зав'язі до збору врожаю
Виноград винних сортів, Столовий виноград	Запобігання в'ялості стебел	2 - 3 внесення по 4 л/га (ретельно потрібно обробити основу стебел) перший обробіток незадовго до повного змикання ягід
	Якість листків, колір листків, фотосинтез, забезпечення магнієм	1 - 2 внесення по 4 л/га у період після цвітіння

Офіційний дистрибутор в Україні:

ТОВ «Біоферт»

м.Тернопіль

Тел./Факс: +38 (0352) 22-55-12

office@biofert.com.ua

www.biofert.com.ua