

Mo

Лебозол®-Молибден

Добрива, які відповідають стандартам ЄС

Розчин молибдену

15,6 % водорозчинного молибдену(214 г/л Мо)

- Компоненти: 15,6 % Мо (214 г/л)
- Густина: 1,37 кг/л
- Показник pH: 7,6

Температура зберігання: не нижче 0° C

Об'єм тари: 1 л

Дія препарату:

Молибден важкодоступний у легких та кислих ґрунтах (заболочені піщані ґрунти, дернові ґрунти та субстрати), а також в посушливих умовах.

Нестача молибдену проявляється більшою мірою на молодих листках, а також виникненням хлорозу на старих листках. Проходить швидкий некроз країв листка, листя скручується, розгортання листка зменшується до середньої жилки. В основному уповільнюється ріст, листя бліде, в'яле. У цвітної капусти може відбутися викривлення та перекручення серцевидних листків.

Культура	Ціль	Рекомендації
Для всіх культур	Забезпечення молибденом	0,25 л/га при позакореновому підживленні (вода: мін. 200 л/га) При використанні ранцевого обприскувача 0,05 - 0,1 %-ний розчин.
Бобові	Урожайність, покращення фіксації азоту повітря бульбашковими бактеріями	1 - 2 внесення по 0,25 л/га
Цукровий буряк	Профілактика деформації листків та симптомів кнотовидних стебел, забезпечення молибденом	0,25 л/га між стадією 6-ти листків та змиканням міжрядь
Капуста, листові та цибулеві овочі	Профілактика деформації листків та симптомів кнотовидних стебел, забезпечення молибденом	1 - 2 внесення по 0,25 л/га як тільки сформується достатня листкова поверхня

Офіційний дистрибутор в Україні:

ТОВ «Біоферт»
м.Тернопіль
Тел./Факс: +38 (0352) 22-55-12
office@biofert.com.ua
www.biofert.com.ua