

S

Лебозол®-Швефель⁸⁰⁰

Сірка елементарна, рідка

56 % Сірки (800 г/л S)

- Компоненти: 56 % S (801 г/л)
- Густина: 1,43 кг/л
- Показник pH: 4,5

Температура зберігання: не нижче 0° C

Об'єм тари: 10 л

Дія препарату:

Сірка важкодоступна у кислих ґрунтах, у легких чи піщаних ґрунтах з низьким вмістом гумусу, у ґрунтах з поганою аерацією. Нестача сірки: поява сірих/жовтих прожилок на молодих листках, низькорослість, блідо-жовте цвітіння, затримка дозрівання та зменшенням вмісту олії в олійних культурах.

Культура	Ціль	Рекомендації
Для всіх культур	Профілактика та усунення дефіциту сірки	2 - 7 л/га при позакореновому підживленні (вода: мін. 300 л/га) При використанні ранцевого обприскувача 0,2 - 1 %-ний розчин.
Зернові	Зменшення схильності до борошнистої роси, забезпечення сіркою	1 - 2 внесення по 3 - 5 л/га від початку кущення
Ріпак	Цвітіння, урожайність, вміст олії, забезпечення сіркою	1 - 2 внесення по 5 - 10 л/га від стадії 6-ти листків до початку цвітіння
Соняшник	Профілактика та усунення дефіциту сірки	1- 2 внесення по 5 - 10 л/га на стадії від 4 до 6 листків
Виноград винних сортів	Профілактика та усунення дефіциту сірки	декілька внесень по 3 - 4 л/га починаючи від формування зелених кінчиків паростків до моменту за місяць до збору врожаю

Офіційний дистрибутор в Україні:

ТОВ «Біоферт»
м.Тернопіль
Тел./Факс: +38 (0352) 22-55-12
office@biofert.com.ua
www.biofert.com.ua