

Капуста, листові та цибулеві овочі

(наприклад капуста, цибуля-порей, салат, цибуля)



Ціль	Рекомендації	Період внесення
Формування кореневої системи, підсилення росту, початковий розвиток	Занурення рослин в 1%-й розчин Амінозол ® або обприскування з нормою 5-10 л/га	до пересадки, або 7-10 днів після посадки
Підвищення ефективності та толерантності до обприскування, врожайність	1 - 2 л/га Амінозол ®	обприскування з післясходовим гербіцидом, особливо при екстремальних погодних умовах
Якість листків, колір листків, фотосинтез, забезпечення магнієм	1 - 2 внесення по 3 - 4 л/га Лебозол ®-Магнізій ⁵⁰⁰	відразу після формування достатньої листової поверхні
Якість листків, початковий розвиток, забезпечення цинком	0,5 - 1 л/га Лебозол ®-Цинк ⁷⁰⁰	відразу після формування достатньої листової поверхні
Якість, профілактика некрозу серцевини в капусті, забезпечення бором	1 - 2 внесення по 2 - 3 л/га Лебозол ®-Бор	відразу, як тільки сформується достатня листова поверхня
Профілактика деформації листків та симптомів кнотовидних стебел, забезпечення молібденом	1 - 2 внесення по 0,25 л/га Лебозол ®-Молібден	як тільки сформується достатня листова поверхня
Профілактика некрозу листків, забезпечення кальцієм	декілька внесень по 3 - 5 л/га Лебозол ®-Кальцій	від 10 - 14 днів після посадки
Відлякуюча дія на тварин	2 л/га Амінозол ® за 2 - 3 дні розмішати з 2 л води при необхідності	при потребі
Покращення ефективності заходів по захисту рослин	150 - 300 мл Амінозол ® на 100 л води	до робочого розчину ЗЗР
Зменшення стресу	2 - 3 л/га Амінозол ®	при стресі багаторазове застосування з маленькими нормами внесення підвищує ефективність