

## Картопля



| Ціль                                                                         | Рекомендації                                                         | Період внесення                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Підвищення ефективності та толерантності до обприскування, врожайність       | 1 - 2 л/га <b>Амінозол®</b>                                          | обприскування з післясходовим гербіцидом, особливо при екстремальних погодних умовах     |
| Більш швидке відростання бадилля у ранньої картоплі після зняття плівки      | 2 - 3 л/га <b>Амінозол®</b>                                          | 1-й обробіток                                                                            |
| Запобігання передчасному опаданні листя, урожайність та забезпечення магнієм | 1 - 2 внесення по 2 - 4 л/га <b>Лебозол®-Магнезіум<sup>500</sup></b> | від початку змикання міжрядь                                                             |
| Якість, забезпечення бором                                                   | 1 - 2 внесення по 1 л/га <b>Лебозол®-Бор</b>                         | при змиканні міжрядь                                                                     |
| Покращення ефективності заходів по захисту рослин                            | 150 - 300 мл <b>Амінозол®</b> на 100 л води                          | до робочого розчину ЗЗР                                                                  |
| Зменшення стресу                                                             | 2 - 3 л/га <b>Амінозол®</b>                                          | при стресі багаторазове застосування з маленькими нормами внесення підвищує ефективність |