

Кісточкові плодові

(наприклад черешня, сливи, персики)



Ціль	Рекомендації	Період внесення
Цвітіння, зав'язь	1 л/га Лебозол®-Бор	на початку цвітіння
Зав'язь, ріст плоду, зменшення пошкоджень	3 внесення по 5 - 7,5 л/га Амінозол®	з моменту цвітіння з інтервалом 8 днів
Якість листків в розетках, забезпечення цинком	2 - 3 внесення по 0,25 л/га Лебозол®-Цинк⁷⁰⁰	після цвітіння
Запобігання передчасному опаданні листків та забезпечення магнієм	2 - 3 внесення по 4 л/га Лебозол®-Магnezіум⁵⁰⁰	з моменту формування зав'язі до збору врожаю
Твердість плодів	2 внесення по 7 - 10 л/га Лебозол®-Кальцій	від зав'язі до збору врожаю
Закладка резервних речовин, регенерація, зимостійкість, якість цвітіння	2 внесення по 2 - 3 л/га Амінозол® 2 внесення по 0,5 л/га Лебозол®-Цинк⁷⁰⁰ 2 внесення по 1 л/га Лебозол®-Бор	після збору врожаю
Покращення ефективності заходів по захисту рослин	150 - 300 мл Амінозол® на 100 л води	до робочого розчину ЗЗР
Зменшення стресу	2 - 3 л/га Амінозол®	при стресі багаторазове застосування з маленькими нормами внесення підвищує ефективність