

Плодоовочеві рослини

(наприклад Бобові, горох, огірки, помідори, паприка)



Ціль	Рекомендації	Період внесення
Формування кореневої системи, підсилення росту, початковий розвиток	Занурення рослин в 1%-й розчин Амінозол® або обприскування з нормою 5-10 л/га	до пересадки, або 7-10 днів після посадки
Якість листків, колір листків, фотосинтез, забезпечення магнієм	1 - 2 внесення по 3 - 4 л/га Лебозол®-Магнезіум⁵⁰⁰	відразу після формування достатньої листової маси
Якість листків, початковий розвиток, забезпечення цинком	0,5 - 1 л/га Лебозол®-Цинк⁷⁰⁰	відразу після формування достатньої листової поверхні
Цвітіння, зав'язь, забезпечення бором	1 - 2 внесення по 2 л/га Лебозол®-Бор	перед цвітінням при достатній листовій поверхні
Твердість плодів, попередження утворення гнилей в кінці періоду цвітіння, забезпечення кальцієм	3 - 4 внесення по 3 - 5 л/га Лебозол®-Кальцій	з моменту формування зав'язі
Відлякуюча дія на тварин	2 л/га Амінозол® за 2 - 3 дні розмішати з 2 л води при необхідності	при потребі
Покращення ефективності заходів по захисту рослин	150 - 300 мл Амінозол® на 100 л води	до робочого розчину ЗЗР
Зменшення стресу	2 - 3 л/га Амінозол®	при стресі багаторазове застосування з маленькими нормами внесення підвищує ефективність