

Полуниця



Ціль	Рекомендації	Період внесення
Формування кореневої системи, підсилення росту, початковий розвиток	Занурення рослин в 1%-й розчин Амінозол ® або обприскування з нормою 5-10 л/га	до пересадки, або 7-10 днів після посадки
Кількість квіткових бруньок, зимостійкість, якість цвітіння	1 л/га Лебозол ®- Цинк ⁷⁰⁰ 2 л/га Лебозол ®- Бор	восени (при пересадці)
Цвітіння, зав'язь, попередження деформації ягід	0,5 л/га Лебозол ®- Цинк ⁷⁰⁰ 1 л/га Лебозол ®- Бор	у фазі зміни кольору бруньок з зеленого на білий
Урожайність, стійкість, забезпечення магнієм	2 - 3 внесення по 4 л/га Лебозол ®- Магnezіум ⁵⁰⁰	від початку цвітіння до збору врожаю
Закладка резервних речовин, регенерація, зимостійкість, якість цвітіння	2 внесення по 2 - 3 л/га Амінозол ® 2 внесення по 0,5 л/га Лебозол ®- Цинк ⁷⁰⁰ 2 внесення по 1 л/га Лебозол ®- Бор	після збору врожаю
Якість рослин при збільшеній густині висадки: сильні рослини, формування відгалужень	2 внесення по 2 - 3 л/га Амінозол ® 2 внесення по 1 л/га Лебозол ®- Бор	14 і 7 днів до збору врожаю
Покращення ефективності заходів по захисту рослин	150 - 300 мл Амінозол ® на 100 л води	до робочого розчину ЗЗР
Зменшення стресу	2 - 3 л/га Амінозол ®	при стресі багаторазове застосування з маленькими нормами внесення підвищує ефективність