

Ріпак



Ціль	Рекомендації	Період внесення
Підвищення ефективності та толерантності до обприскування, врожайність	1 - 2 л/га Амінозол®	обприскування з післясходовим гербіцидом, особливо при екстремальних погодних умовах
Зимостійкість, рівномірне цвітіння та дозрівання, урожайність, забезпечення бором	2 - 3 л/га Лебозол®-Бор	восени на стадії 4 - 6 листків
Цвітіння, урожайність, вміст олії, забезпечення сіркою	1 - 2 внесення по 5 - 10 л/га Лебозол®-Швефель⁵⁰⁰	від стадії 6-ти листків до початку цвітіння
Рівномірне цвітіння та дозрівання, урожайність, забезпечення бором	2 - 3 л/га Лебозол®-Бор	навесні до початку цвітіння
Урожайність, стійкість, забезпечення магнієм	1 - 2 внесення по 2 - 4 л/га Лебозол®-Магnezіум⁵⁰⁰	між стадією 6-ти листків та початком росту пагонів
Урожайність, покращення фіксації азоту повітря бульбашковими бактеріями	1 - 2 внесення по 0,25 л/га Лебозол®-Молибден	з моменту росту пагонів
Покращення ефективності заходів по захисту рослин	150 - 300 мл Амінозол® на 100 л води	до робочого розчину ЗЗР
Зменшення стресу	2 - 3 л/га Амінозол®	при стресі багаторазове застосування з маленькими нормами внесення підвищує ефективність