

Столовий виноград



Ціль	Рекомендації	Період внесення
Профілактика та усунення дефіциту сірки	декілька внесень по 3 - 4 л/га Лебозол®-Швєфель⁸⁰⁰	починаючи від зелених кінчиків паростків до початку дозрівання
Цвітіння, зав'язь, рівномірне дозрівання	1 внесення по 1 л/га Лебозол®-Цинк⁷⁰⁰ 2 внесення по 1 л/га Лебозол®-Бор	з моменту збільшення бруньок до початку цвітіння
Якість листків, колір листків, фотосинтез, забезпечення магнієм	1 - 2 внесення по 4 л/га Лебозол®-Магнезіум⁵⁰⁰	період після цвітіння
Запобігання в'ялості стебел	2 - 3 внесення по 4 л/га Лебозол®-Магнезіум⁵⁰⁰ (ретельно потрібно обробити основу стебла)	перший обробіток незадовго до повного змикання ягід
Закладка резервних речовин, регенерація, зимостійкість, якість цвітіння	2 внесення по 2 - 3 л/га Амінозол® 2 внесення по 0,5 л/га Лебозол®-Цинк⁷⁰⁰ 2 внесення по 1 л/га Лебозол®-Бор	після збору врожаю
Відлякуюча дія на тварин	2 л/га Амінозол® за 2 - 3 дні розмішати з 2 л води при необхідності	при потребі
Покращення ефективності заходів по захисту рослин	150 - 300 мл Амінозол® на 100 л води	до робочого розчину ЗЗР
Зменшення стресу	2 - 3 л/га Амінозол®	при стресі багаторазове застосування з маленькими нормами внесення підвищує ефективність